

Koepala ihosta – haavanhoito-ohje

Sinulta on otettu koepala sairauden syyn selvittämiseksi. Koepalalla tarkoitetaan kudosnäytettä, joka laboratoriossa leikataan ohuiksi siivuiksi, värjätään ja tutkitaan mikroskoopilla. Kun koepala otetaan iho- tai limakalvomuutoksesta, pieni muutos poistetaan paikallispuudutuksessa kokonaan ja isosta muutoksesta otetaan näytteeksi vain osa. Pinnallisia koepaloja varten ihoa ei aina tarvitse puuduttaa.

Koepala on otettu stanssilla, rengasveitsellä tai ns. kauhalla. Näin syntyneitä 4 mm:n mittaisia ja sitä pienempiä haavoja ei välttämättä tarvitse sulkea ompelemalla.

Haavanhoito koepalan ottamisen jälkeen

Koepalan ottokohdan päällä on pala verenvuotoa tyrehdyttävää levyä (Spongostan®), joka on kiinnitetty teipillä tai sidoksella. Haava ja sidokset pidetään kuivana 1 vrk ajan. Tämän jälkeen voit peseytyä normaalisti. Jos päällimmäinen side kastuu, voi sen poistaa.

Koepalan ottokohdan Spongostan® – levyä pidetään paikoillaan 2 vrk ajan. Kun poistat sidoksia kahden vuorokauden kuluttua, suihkuta näytteenottoa kevyesti ja kuivaa taputellen, esim. puhtaalla talouspaperilla. Tarkista, että kaikki sidosmateriaali poistuu iholta. Tämän jälkeen voit tarvittaessa suojata koepalan ottokohdan muulla sidoksella tai laastarilla.

Patologin vastaus tavallisesta koepalasta saadaan yleensä noin 3 – 4 viikon kuluessa.

- Voit katsoa vastauksen Omakanta-palvelusta. Lääkäri kirjaa jatkosuunnitelman potilaskertomukseen.
- Vastauksen perusteella lääkäri voi myös tarvittaessa soittaa sinulle suoraan, vaikka olisitkin aluksi sopineet, että katsot vastauksen Omakanta-palvelusta.
- Sinulle on varattu puhelinaika vastauksen kuulemiseksi, lääkärin puhelun ajankohta

Hyväksytty:

Ilkka Käsmä, vastaava lääkäri

Päivittäjä:

Johanna Pekkilä, kehittäjäsaaraanhoitaja

Päiväys:

4.6.2020